



Consejos para la Casa o para la Escuela

Conciencia de Temas Mèdicos en Relaciòn a Los Cambios en el Comportamiento



Por: California Deaf-Blind Services

n.d.

Los individuos que tienen dos sentidos incapacitados quizà demuestran comportamientos que frecuentemente se consideran impropios. Estos comportamientos pueden ser interpretados como extraños movimientos de la cabeza, raras posturas del cuerpo, inexplicables reacciones emocionales, movimientos de auto-estimulación, sin complacencia, berrinches, etc. Los individuos que tienen dos sentidos incapacitados es posible que intnten de compensar la pèrdida de la vista, la pèrdida auditiva y/o un impedimento físico del cual quizà este relacionado con su incapacidad específica. Muchos de estos comportamientos son causados por reacciones de problemas mèdicos y/o por los efectos de la medicina que es administrada por la necesidad de controlar los problemas mèdicos.

Estos comportamientos son màs importantes si hay un cambio del comportamiento usual del individuo. El cambio en el comportamiento puede indicar un cambio en la condición mèdica del individuo que tiene dos sentidos incapacitados. Debería considerarse atención mèdica inmediata para eliminar como causa del cambio en el comportamiento a los problemas mèdicos.

Los esquemas siguientes dan una descripción de algunas condiciones mèdicas frecuentemente asociadas con la sordera y la ceguera. El comportamiento debería discutirse completamente con un mèdico para determinar el diagnòstico y el tratamiento mèdico.

Tema	Componentes	Señales de Comportamiento	Preguntas Para El Medico	Evaluación	Administración en la Casa/Clase	Reacciones Emocionales
Problemas con la postura del cuerpo	Parálisis Cerebral	No poner atención	Método para evitar reflejos Limitaciones	Examen por un terapeuta	Postura Terapia	Emoción Temor
	Hipotónico-a	Fatiga	Limitaciones	Examen por un terapeuta	Postura	
	Dislocación de la cadera	Dolor Llorar Poner resistencia a los movimientos	Tratamiento Fusión Limitaciones	Examen por un terapeuta	Vendaje Cirugía Postura	Temor Incomodidad
	Escolosis	Curvatura de la espina	Tratamiento y consejo para la terapia	Examen por un terapeuta	Vendaje Cirugía Postura	Incomodidad

Tema	Componentes	Señales de Comportamiento	Preguntas Para El Medico	Evaluación	Administración en la Casa/Clase	Reacciones Emocionales
Problemas del Oído	Perdida Conductiva	Congestión Dedos en los oídos No escuchar Jalarse los oídos Hablar muy fuerte	Examen Alergias	Examen por un especialista	Medicina Tubos Cirugía Aparatos auxiliares	Frustración Paranoia Supresión
	Perdida Sensorialneural	No escuchar No responder a sonidos particulares ni a ninguno	Examen	Examen por un especialista de nariz, oídos, y garganta y un audiólogo	Aparatos auxiliares Instrucciones auditivas Sistemas de comunicación aumentativas	Frustración Confusión Aislamiento social Dificultad con el concepto de ser
	Alergias	Desatención variable Congestión Dolor Dificultad para respirar Sarpullido No dormir	Sensibilidades	Examen por un especialista en alergias o un especialista de nariz, oídos, y garganta	Medicina Inyecciones para la alergia Modificación del ambiente	Frustración Confusión



Tema	Componentes	Señales de Comportamiento	Preguntas Para El Medico	Evaluación	Administración en la Casa/Clase	Reacciones Emocionales
Problemas de las Vista	Vista cerca y de lejos	Denteniendo cerca la cara No poner atención Bizzo/Estrabismo Respondiendo a objetos que se encuentran lejos o cerca pero no a los dos	Causa Examen	Examen por un oculista	Lentes Sentarse Posición de objetos y de la gente	Supresión Aislamiento social Temor
	Vista perdida	Voltear la cabeza/ inclinarla Rechazar el ejercicio Torpeza Movimiento impedido	Area de la vista perdida	Examen por un oculista	Posición de objetos y de la gente	Temor Frustración Supresión El rechazar actividades especificas que requieren el use del area dañada
	Glaucoma	Berrinche Darse un golpe en el ojo Pegarse con la cabeza Dolor	Examen	Examen por un oftalmólogo (médico oculista especializado en trastornos y enfermedades de la vista)	Gotas para los ojos Cirugla	Enojo Confusión
	Cataratas	Lentes nublados Darse un golpe en el ojo Falta de enfocar bien Buscar la luz	Tratamiento	Examen por un oftalmólogo	Cirugla	Ajuste de la ceguera
	Nistagmo (contracción involuntaria del globo ocular)	Movimientos rapidos y pequeños del ojo (horizontal o vertical)	Cause Tratamiento Resultado de la vista y la habilidad de enfocar	Examen por un oftalmólogo	Posición de objetos y de la gente Darle tiempo para entender la información visual	Frustración
	Sensibilidad de la luz	Evitar la luz Inclinar la cabeza hacia abajo Cerrar los ojos Llorar Tener dolor	Causa	Examen por un oftalmólogo	Visera, sombrero para el sol Lentes para el sol Un cuarto con luz Respaldar a los estudiantes cuando el nivel de la luz cambia de un lugar a otro	Temor Incomodiad Enojo



Tema	Componentes	Señales de Comportamiento	Preguntas Para El Medico	Evaluación	Administración en la Casa/Clase	Reacciones Emocionales
Problemas Físicos	Resistencia del corazón	Fatiga Falta de aire Cambio en el color de la piel y/o la temperatura de piel	Limitaciones	Examen por un especialista	Medicina Cirugía	Frustración Temor
	Asma	Respirar asmáticamente Presión en el pecho Fatiga Dolor	Limitaciones Causa	Examen por un terapeuta	Medicina Entrenamiento para relajarse Modificación del ambiente Postura	Temor Frustración Vergüenza
	Diabetes	Orina frecuente Orina en volumen	Limitaciones	Examen por un especialista y un oftalmólogo	Medicina Dieta	Frustración Vergüenza
	PMS	Irritabilidad Deseo exagerado de comidas Cada mes cambios en la conducta	Dieta Vitaminas Ejercicio Medicina	Examen por un especialista y un dietista	Dieta Vitaminas Ejercicio Medicina	Todas las reacciones
	Nutrición	Fatiga Dificultad para atender Llorar	Dieta Vitaminas Comidas alergicas	Examen por un especialista y/o un dietista	Dieta Vitaminas Tubo gastrointestinal	Supresión Depresión
	Ataques psicomotores	Forma de un Berrinche Dormir después del berrinche No responder durante el berrinche	Examen	Examen por un neurólogo	Medicina	Confusión Enojo
	Medicamentos --Conducta --Ataques	Pequeños estremecimientos como movimientos Sueño	Comparar los efectos secundarios contra los beneficios	Examen por un especialista y re-evaluación durante la pubertad	Comunicación cercana con el especialista	Confusión Frustración
	Pubertad	Cambio en la conducta Cambio en la vista Torpeza Cambio de peso Dolor durante el crecimiento Extrañas sensaciones El cuerpo y la piel muy sensibles	Desarrollo normal y los efectos con la medicina	Examen por un especialista	Reírse mucho Asistir con un consejero Educación Ver de cerca un grupo de apoyo	Confusión Vergüenza Supresión Ansiedad Egocentrismo

